

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
28.03.12. № 211
Реєстраційне посвідчення
№ UA/12080/01/01

ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату

КІНДІНОРМ Н
(KINDINORM® N)

Склад лікарського засобу:

діючі речовини: для 10 г гранул використано Chamomilla D12 25 мг, Kalium phosphoricum D6 25 мг, Staphisagria D12 25 мг, Valeriana D6 25 мг;

допоміжна речовина: сахароза.

Лікарська форма. Гранули.

Приблизно сферичні, білуваті гранули.

Назва і місцезнаходження виробника.

Дойче Хомеопаті-Уніон ДХУ-Арцнайміттель ГмбХ & Ко. КГ.

Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруе, Німеччина.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Гомеопатичний комбінований лікарський засіб усуває поведінкові і когнітивні розлади у дітей та дорослих.

Активні інгредієнти препарату ефективно послаблюють типові симптоми, такі як порушення концентрації уваги, підвищена збудливість, непосидючість, труднощі в навчанні, розлади сну і стани загальної слабкості. Також препарат чинить заспокійливу і стабілізуючу дію на психічний стан пацієнта.

Показання для застосування.

Поведінкові розлади у дітей та дорослих, що супроводжуються порушенням концентрації уваги, підвищеною збудливістю, непосидючістю, труднощами в навчанні, розладами сну або загальною слабкістю.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до компонентів препарату.

Належні заходи безпеки при застосуванні.

При застосуванні гомеопатичних лікарських засобів можливе тимчасове первинне погіршення. У цьому випадку пацієнту потрібно припинити прийом препарату і проконсультуватися з лікарем.

Препарат містить сахарозу. Пацієнтам із рідкісними спадковими формами непереносимості фруктози, синдромом глюкозо-галактозної мальабсорбції або недостатністю сахарази-ізомальтази не слід застосовувати препарат.

Особливі застереження.***Застосування у період вагітності або годування груддю.***

Кіндінорм Н у період вагітності або годування груддю можна застосовувати лише після ретельної оцінки лікарем співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.

Діти. Не застосовувати препарат дітям віком до 1 року через недостатність даних про безпеку і ефективність.

Перш ніж розпочати прийом препарату Кіндінорм Н дітям віком від 1 року до 6 років, рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та дози.

Діти віком від 1 року до 5 років: по 2 гранули 1 - 3 рази на добу.

Діти віком від 6 до 11 років: по 3 гранули 1 - 3 рази на добу.

Дорослі та діти віком від 12 років: по 5 гранул 1 - 3 рази на добу.

Частоту прийому можна зменшити після настання поліпшення.

Гранули приймати за півгодини до або через півгодини після їди, даючи їм повільно розчинитися в роті. Дітям віком до 3 років для зручності застосування гранули можна розчиняти в невеликій кількості води (наприклад, у чайній ложці).

Курс лікування визначає лікар індивідуально; зазвичай він становить 8 тижнів.

При відсутності поліпшення після 8 тижнів лікування препаратом або при погіршенні стану слід проконсультуватися з лікарем.

Передозування. Не встановлено.

Можливе підвищення частоти виникнення побічних реакцій.

Побічні ефекти. Можливі алергічні реакції. При виникненні будь-яких небажаних реакцій слід припинити застосування препарату та звернутися до лікаря.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Невідомі.

Застосування даного гомеопатичного лікарського засобу не виключає застосування інших лікарських засобів.

Термін придатності. 5 років.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Умови зберігання.

Не потребує спеціальних умов зберігання. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

По 10 г гранул у флаконі; по 1 флакону у картонній коробці.

Категорія відпуску. Без рецепта.

Дата останнього перегляду.

Українська фармацевтична компанія
Державна науково-технічна лабораторія
лікарських препаратів
власного виробництва

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства
здравоохранения Украины
28.03.12. № 211
Регистрационное удостоверение
№ UA/12080/01/01

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

КИНДИНОРМ Н
(KINDINORM® N)

Состав лекарственного средства:

действующие вещества: для 10 г гранул использовано Chamomilla D12 25 мг, Kalium phosphoricum D6 25 мг, Staphisagria D12 25 мг, Valeriana D6 25 мг;
вспомогательное вещество: сахароза.

Лекарственная форма. Гранулы.

Приблизительно сферические, беловатые гранулы.

Название и местонахождение производителя.

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.
Оттоштрассе 24, 76227 Карлсруэ, Германия.

Фармакотерапевтическая группа. Комплексный гомеопатический препарат.

Гомеопатическое комбинированное лекарственное средство устраняет поведенческие и когнитивные расстройства у детей и взрослых. Активные ингредиенты препарата эффективно ослабляют типичные симптомы, такие как нарушение концентрации внимания, повышенная возбудимость, непоседливость, трудности в обучении, расстройства сна и состояния общей слабости. Также препарат оказывает успокоительное и стабилизирующее действие на психическое состояние пациента.

Показания к применению.

Поведенческие расстройства у детей и взрослых, сопровождающиеся нарушением концентрации внимания, повышенной возбудимостью, неусидчивостью, трудностями в обучении, расстройствами сна или общей слабостью.

Противопоказания.

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Надлежащие меры безопасности при применении.

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно временное первичное ухудшение. В этом случае пациенту следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат содержит сахарозу. Пациентам с редкими наследственными формами непереносимости фруктозы, синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции или сахарозно-изомальтазной недостаточностью не следует применять препарат.

Особые предостережения.***Применение в период беременности или кормления грудью.***

Киндинорм Н в период беременности или кормления грудью можно применять только после тщательной оценки врачом соотношения польза для матери/риск для плода (ребенка).

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.

Дети. Не применять препарат детям до 1 года ввиду недостаточности данных о безопасности и эффективности.

Прежде чем начать прием препарата Киндинорм Н детям от 1 года до 6 лет, рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы.

Детям от 1 года до 5 лет: по 2 гранулы 1 - 3 раза в день.

Детям от 6 до 11 лет: по 3 гранулы 1 - 3 раза в день.

Взрослым и детям от 12 лет: по 5 гранул 1 - 3 раза в день.

Частоту приема можно уменьшить после наступления улучшения.

Гранулы принимать за полчаса до или через полчаса после еды, давая им медленно раствориться во рту. Детям до 3 лет для удобства применения гранулы можно растворять в небольшом количестве воды (например, в чайной ложке).

Курс лечения определяет врач индивидуально; обычно он составляет 8 недель.

При отсутствии улучшения после 8 недель лечения препаратом или при ухудшении состояния следует проконсультироваться с врачом.

Передозировка. Не установлена.

Возможно повышение частоты возникновения побочных реакций.

Побочные эффекты. Возможны аллергические реакции. При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.

Неизвестны. Применение данного гомеопатического лекарственного средства не исключает применения других лекарственных средств.

Срок годности. 5 лет.

Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия хранения.

Не требует специальных условий хранения. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка.

По 10 г гранул во флаконе; по 1 флакону в картонной коробке.

Категория отпуска. Без рецепта.

Дата последнего пересмотра.

Заявитель: ООО «А.С.
Лекарства и медицинские изделия», ин-
формационно-консультационный центр
«А.С.Лекарства»